

DK/EP

Oversættelse vedr. EP patentansøgning/EP patent

Modtaget

- 3 APR. 2002

Trykningsgebyr:

Ansøgers/fuldmægtiges referencenumr.: PVS
MB/KM/107089

Ansøger (fullt navn og adresse):

Flere ansøgere på side 2

Danisco A/S
Langebrogade 1
P.O. Box 17
1001 København K
DK

Fuldmægtig (navn og adresse):

BUDDE, SCHOU & OSTENFELD A/S
Vester Søgade 10
DK-1601 København V

Dansk benævnelse:

Lipase og anvendelse heraf til forbedring af deje og bagte produkter.

Billedstegnelse:

- Dansk oversættelse af krav (T1) i 2 ekspl.
 - Rettet dansk oversættelse af krav (T2) i 2 ekspl.
 - Dansk oversættelse af patent (T3)
 - Dansk oversættelse af ændret patent (T4)
 - Rettet dansk oversættelse af patent (T5)
 - Tegning
 - Fuktnagt
-

Dato og underskrift:

3. april 2002

BUDDE, SCHOU & OSTENFELD A/S

Ghitta Pekneu

EP ansøgningsnummer:

01204340.2

EP publiceringsnummer:

1 193 314

EP patenterummer:

Patent- og Varemærkestyrelsen

Holgeskjøj Allé 81
DK-2630 Taastrup
Telefon 43 50 80 00
Telefax 43 50 80 01
E-post pvs@dkpro.dk

DK/EP

NZAS-0155906



BUDDE, SCHOU & OSTENFELD A/S

MB/KM/107089

**EP.ANS. 01204340.2
PATENT NR.**

KRAVOVERSÆTTELSE

ANSØGER:

Danisco A/S

BENÆVNELSE:

Lipase og anvendelse heraf til forbedring af dej og bagte produkter.

NZAS-0155907

Patentkrav

1. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde; og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosyl-monoglycerider, hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere mindst 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i en dej indeholdende mel, til monoglycerider.
- 10 2. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibrænder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C, og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosylmonoglycerider, hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere mindst 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i dej indeholdende mel, til monoglycerider.
- 20 3. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibrænder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C, og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7.
- 30 4. Et polypeptid med lipaseaktivitet hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde; og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosyl-monoglycerider.
- 35 5. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibrænder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C og ved en pH som ligger mellem 3,5-8

inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosyldiglycerider.

- 5 6. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosyldiglycerid (DGMG).
- 10 7. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibrænder mindst 15 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosyldiglycerid (DGMG).
- 20 8. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde; og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende 25 galactosyldiglycerider, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosyldiglycerid (MGMG) og digalactosyldiglycerid (DGMG).
- 30 9. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde; og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosyldiglycerider, hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolyse mindst 35 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i dej indeholdende mel, til monoglycerider, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere

glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosyl-monoglycerid (DGMG).

- 5 10. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibeholder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C, og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosylmonoglycerider, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosylmonoglycerid (DGMG).
- 15 11. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibeholder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C, og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosylmonoglycerider, hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere mindst 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i dej indeholdende mel, til monoglycerider, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosylmonoglycerid (DGMG).
- 30 12. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde.
- 35 13. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosylmonoglycerid (DGMG).

14. Et polypeptid omfattende mindst én aminosyresekvens vist heri som SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2 og SEQ ID NO:3.
- 5 15. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvori polypeptidet
kan afledes fra *Aspergillus tubigensis* og/eller hvori, polypeptidet har følgende
karakteristika:
- 10 (i) Det bibeholder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C og ved en pH som
ligger mellem 3,5-8,
- (ii) det bibeholder mindst 60% af dets aktivitet efter 1 time ved 60°C i 100 mM
natriumacetatbuffer ved pH 5,0, og
- 15 (iii) det har et isoelektrisk punkt som, bestemt ved isoelektrisk fokusering, ligger
mellem 3,5-4,5.
16. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, som omfatter
mindst én aminosyresekvens udvalgt fra gruppen bestående af
- 20 SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2 og SEQ ID NO:3, hvor Xaa i omtalte sekvenser er en
aminosyre udvalgt fra gruppen bestående af Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly,
His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr og Val.
17. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav som har enzymatisk
25 aktivitet ved en pH som ligger mellem 3,5-8.
18. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, som bibeholder
mindst 80% af dets aktivitet efter en time ved 50°C i 100 mM natriumacetatbuffer ved
pH 5,0.
- 30
19. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav som, bestemt ved
iselektrisk fokusering, har et isoelektrisk punkt på $4,1 \pm 0,1$.
20. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav som er i stand til at
35 hydrolysere mindst 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i dej
inneholdende mel, til de tilsvarende galactosylmonoglycerider.

21. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet i det væsentlige er på ikke-glycosyleret form.
- 5 22. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet er en del af et fusionsprodukt omfattende yderligere enzymatisk aktive aminosyresekvenser.
23. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet i
10 det væsentlige er på oprenset form.
24. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet har en molekylvægt som, bestemt ved matrix-assisteret laserdesorptions-ioniserings-massespektrometri (MALDI-MS), er på $31 \pm 1,5$ kDa.
- 15 25. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet omfatter aminosyresekvensen vist som SEQ ID NO:9 eller en variant, homolog eller fragment heraf.
- 20 26. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet ikke omfatter aminosyre(r) som tilvejebringer glycosylerings-site(s).
- 25 27. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet er afledt fra en organisme udvalgt fra gruppen bestående af en svamp, gær, bakterie,
plantecelle og dyrecelle.
- 30 28. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav for hvilket det gælder at det, ved tilsætning af polypeptidet til brøddej i en mængde på 5.000 LUS pr. kg mel, reducerer den gennemsnitlige porediameter i krummen på brød fremstillet fra denne dej med mindst 10%, i forhold til brød som er fremstillet fra en brøddej, der ikke er tilsat lipasen.
- 35 29. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav for hvilket det gælder at det, når det sættes til en brøddej i en mængde på 5.000 LUS pr. kg mel, øger porehomogeniteten af krummen på brød fremstillet fra denne dej med mindst 5%, i forhold til brød som er fremstillet fra brøddej, der ikke er tilsat lipasen.

30. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav for hvilket det gælder at det, når det sættes til brøddej i en mængde på 5.000 LUS pr. kg mel, øger dejens glutenindeks med mindst 5%, i forhold til dej der ikke er tilsat polypeptidet; glutenindekset bestemmes ved hjælp af et Glutomatic 2200 apparat.

5

31. Et rekombinant DNA-molekyle omfattende en nucleotid-sekvens kodende for polypeptidet ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30.

32. Et rekombinant DNA-molekyle ifølge krav 31 omfattende mindst én af SEQ ID

10 NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6 og SEQ ID NO:7.

33. Et rekombinant DNA-molekyle ifølge krav 31 omfattende SEQ ID NO:8 eller en variant, homolog eller fragment deraf eller en sekvens som er komplementær dertil.

15 34. Et rekombinant DNA-molekyle ifølge krav 31 som koder for et polypeptid som defineret i et hvilket som helst af kravene 1-30, som ikke omfatter aminosyre(r) som tilvejebringer glycosylerings-site(s).

20 35. Et rekombinant DNA-molekyle ifølge krav 31, som er et plasmid udvalgt fra gruppen bestående af et plasmid deponeret under accessionsnumrene NCIMB 40863, NCIMB 40931, NCIMB 40932, NCIMB 40933, NCIMB 40934 og NCIMB 40935.

25 36. En celle omfattende et rekombinant DNA-molekyle ifølge et hvilket som helst af kravene 31-35 og som er i stand til at udtrykke polypeptidet ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30.

37. En celle ifølge krav 36 som er en mikroorganisme udvalgt fra gruppen bestående af en svamp, gær, bakterie, plantecelle og dyrecelle.

30 38. En celle ifølge krav 37 som er en filamentøs svamp udvalgt fra gruppen bestående af en *Aspergillus* sp., en *Penicillium* sp., en *Rhizomucor* sp., en *Mucor* sp., en *Trichoderma* sp., en *Neurospora* sp. og en *Humicola* sp.

39. En celle ifølge krav 38 som er *Aspergillus tubigensis*.

35

40. En fremgangsmåde til fremstilling af et polypeptid ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30 omfattende transformation af en værtscelle med et rekombinant DNA-molekyle ifølge et hvilket som helst af kravene 31-39, værtsellen er i stand til at udtrykke nucleotidsekvensen kodende for polypeptidet, dyrkning af den 5 transformerede værtscelle under betingelser, hvor nucleotidsekvensen udtrykkes og opsamling af polypeptidet.
41. En fremgangsmåde ifølge krav 40 som omfatter yderligere trin til isolering af polypeptidet på i det væsentlige ren form.
- 10
42. En fremgangsmåde til fremstilling af et bagt produkt med forbedret porehomogenitet og reduceret porediameter, fremgangsmåden omfatter tilsætning af polypeptidet ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30 eller polypeptidet fremstillet ifølge krav 40 eller 41 til dejen.
- 15
43. En fremgangsmåde ifølge krav 42, hvori dejen ikke indeholder tilsatte lipider.
44. En fremgangsmåde ifølge krav 42 eller 43, omfattende tilsætning af polypeptidet til dejen, i en mængde som resulterer i mindst 10% reduktion af den gennemsnitlige 20 porediameter i krummen på brød fremstillet fra dejen, i forhold til et brød som er fremstillet fra en brøddej uden tilsætning af polypeptidet.
45. En fremgangsmåde ifølge krav 42 eller 43, omfattende tilsætning af polypeptidet til dejen, i en mængde som resulterer i mindst 5% stigning i porehomogeniteten i 25 krummen på brød fremstillet fra dejen, i forhold til et brød som er fremstillet fra en brøddej uden tilsætning af polypeptidet.
46. En fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 42-45, omfattende tilsætning af polypeptidet til dejen, i en mængde som resulterer i mindst 5% stigning i 30 dejens glutenindeks i forhold til en dej der ikke tilsættes polypeptidet; glutenindekset er bestemt ved hjælp af et Glutomatic 2200 apparat,
47. En fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 42-45, hvori polypeptidet sættes til dejen i en mængde som ligger mellem 100-30.000 lipase units (LUS) pr. kg 35 mel inkluderende en mængde som ligger mellem 500-10.000 lipase units (LUS) pr. kg. mel.

48. En fremgangsmåde ifølge krav 47, hvori en emulgator sættes til dejen.
49. En fremgangsmåde ifølge krav 48, hvori emulgatoren er diacetylvinylsyreester af
5 mono- og diglycerider af spiselige fedtsyrer.
50. En fremgangsmåde ifølge krav 49, hvori diacetylvinylsyreesteren har en
forsæbningsværdi som ligger mellem 300 og 600 og en syreværdi som ligger mellem
40 og 120.
- 10
51. En fremgangsmåde ifølge krav 50, hvori diacetylvinylsyreesteren tilsættes i en
mængde som ligger mellem 0,1-1,0 vægt-% af melet.
52. En fremgangsmåde ifølge krav 42 hvori mindst et yderligere enzym sættes til
15 dejen.
53. En fremgangsmåde ifølge krav 52 hvori det yderligere enzym er udvalgt fra
gruppen bestående af en hemicellulase, en protease, en amylase, en oxidoreduktase
og en cellulase.
- 20
54. Anvendelse af et polypeptid ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30 eller et
polypeptid fremstillet ved en proces ifølge krav 40, i en dej til et bagt produkt for at
forbedre stabiliteten af glutennetværket i dejen og/eller for at bibringe forbedret
porehomogenitet og/eller for at reducere porediameteren i det bagte produkt og/eller
25 for at gøre bagte produkter mindre tilbøjelige til at deformeres mekanisk.
55. Anvendelse ifølge krav 54 hvori glutenindekset i dejen er øget med mindst 5% i
forhold til en dej som er fremstillet uden tilsætning af polypeptidet; glutenindekset
bestemmes ved hjælp af et Glutomatic 2200 apparat.
- 30
56. En dejforbedrende sammensætning omfattende polypeptidet ifølge et hvilket som
helst af kravene 1-30 og mindst én yderligere konventionel dej-additiv-bestanddel.
57. En sammensætning ifølge krav 56 hvori den yderligere forbindelse er valgt fra
35 gruppen bestående af et enzym og en emulgator.

58. Et rekombinant DNA-molekyle omfattende en nucleotid-sekvens kodende for et polypeptid udvisende lipaseaktivitet som omfatter mindst én af aminosyresekvenserne vist heri som SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2 og SEQ ID NO:3 eller en nucleotid-sekvens kodende for et polypeptid udvisende lipaseaktivitet som omfatter aminosyresekvensen vist som SEQ ID NO. 9.
59. Et rekombinant DNA-molekyle omfattende mindst ét af SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6 og SEQ ID NO:7 eller i det mindste den kodende sekvens af nucleotid-sekvensen vist som SEQ ID NO:8 eller en variant, homolog eller fragment deraf eller en sekvens der er komplementær dertil.
- 10



BUDDE, SCHOU & OSTENFELD A/S

MB/KM/107089

EP.ANS. 01204340.2
PATENT NR.

KRAVOVERSÆTTELSE

ANSØGER:

Danisco A/S

BENÆVNELSE:

Lipase og anvendelse heraf til forbedring af dej og bagle produkter.

NZAS-0155917

Paten tk r a v

1. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde; og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosyl-monoglycerider, hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere mindst 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i en dej indeholdende mel, til monoglycerider.
- 5 10 15 20 25 30 35
2. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibeholder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C, og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosylmonoglycerider, hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere mindst 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i dej indeholdende mel, til monoglycerider.
3. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibeholder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C, og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7.
4. Et polypeptid med lipaseaktivitet hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde; og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosyl-monoglycerider.
5. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibeholder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C og ved en pH som ligger mellem 3,5-8

inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosyldiglycerider.

- 5 6. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosyl-monoglycerid (MGMG) og digalactosyldiglycerid (DGMG).
- 10 7. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibrækkes mindst 15 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosyl-monoglycerid (MGMG) og digalactosyldiglycerid (DGMG).
- 20 8. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde; og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende 25 galactosyldiglycerider, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosyldiglycerid (MGMG) og digalactosyldiglycerid (DGMG).
- 30 9. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde; og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosyldiglycerider, hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolyse mindst 35 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i dej indeholdende mel, til monoglycerider, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere

glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosyl-monoglycerid (DGMG).

- 5 10. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibrænder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C, og ved en pH som ligger mellem 3,5-8 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at
10 hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosylmonoglycerider, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosylmonoglycerid (DGMG).
- 15 11. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde, hvori omtalte polypeptid bibrænder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C, og ved en pH som ligger mellem 3,5-8
20 inkluderende en pH som ligger mellem 5-7, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere galactolipider, som normalt er til stede i mel, til de tilsvarende galactosylmonoglycerider, hvori omtalte polypeptid er i stand til at hydrolysere mindst 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i dej indeholdende mel, til monoglycerider, hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere
25 glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosylmonoglycerid (DGMG).
- 30 12. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid er et triacylglycerol-hydrolyserende enzym, og hvori omtalte polypeptid er i stand til at fraspalte fedtsyrer med kort, medium og lang kædelængde.
- 35 13. Et polypeptid med lipaseaktivitet; hvori omtalte polypeptid ved hydrolyse er i stand til at modificere glycolipiderne, monogalactosyldiglycerid (MGDG) og digalactosyldiglycerid (DGDG) til de mere polære forbindelser monogalactosylmonoglycerid (MGMG) og digalactosylmonoglycerid (DGMG).

14. Et polypeptid omfattende mindst én aminosyresekvens vist heri som SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2 og SEQ ID NO:3.
- 5 15. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvori polypeptidet
kan afledes fra *Aspergillus tubigensis* og/eller hvori, polypeptidet har følgende
karakteristika:
- (i) Det bibeholder mindst 80% aktivitet efter 4 dage ved 20°C og ved en pH som
10 ligger mellem 3,5-8,
- (ii) det bibeholder mindst 60% af dets aktivitet efter 1 time ved 60°C i 100 mM
natriumacetatbuffer ved pH 5,0, og
- 15 (iii) det har et isoelektrisk punkt som, bestemt ved isoelektrisk fokusering, ligger
mellem 3,5-4,5.
16. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, som omfatter
mindst én aminosyresekvens udvalgt fra gruppen bestående af
- 20 SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2 og SEQ ID NO:3, hvor Xaa i omtalte sekvenser er en
aminosyre udvalgt fra gruppen bestående af Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly,
His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr og Val.
17. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav som har enzymatisk
25 aktivitet ved en pH som ligger mellem 3,5-8.
18. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, som bibeholder
mindst 80% af dets aktivitet efter en time ved 50°C i 100 mM natriumacetatbuffer ved
pH 5,0.
- 30 19. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav som, bestemt ved
iselektrisk fokusering, har et isoelektrisk punkt på 4,1 ± 0,1.
20. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav som er i stand til at
35 hydrolysere mindst 10% af de galactosyldiglycerider, som normalt er til stede i dej
indeholdende mel, til de tilsvarende galactosyimonoglycerider.

21. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet i det væsentlige er på ikke-glycosyleret form.
- 5 22. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet er en del af et fusionsprodukt omfattende yderligere enzymatisk aktive aminosyresekvenser.
23. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet i
10 det væsentlige er på oprenset form.
24. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet har en molekylvægt som, bestemt ved matrix-assisteret laserdesorptions-ioniserings-massespektrometri (MALDI-MS), er på $31 \pm 1,5$ kDa.
- 15 25. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet omfatter aminosyresekvensen vist som SEQ ID NO:9 eller en variant, homolog eller fragment heraf.
- 20 26. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet ikke omfatter aminosyre(r) som tilvejebringer glycosylerings-site(s).
- 25 27. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav hvori polypeptidet er afledt fra en organisme udvalgt fra gruppen bestående af en svamp, gær, bakterie,
plantecelle og dyrecelle.
- 30 28. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav for hvilket det gælder at det, ved tilsætning af polypeptidet til brøddej i en mængde på 5.000 LUS pr. kg mel, reducerer den gennemsnitlige porediameter i krummen på brød fremstillet fra denne dej med mindst 10%, i forhold til brød som er fremstillet fra en brøddej, der ikke er tilsat lipasen.
- 35 29. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav for hvilket det gælder at det, når det sættes til en brøddej i en mængde på 5.000 LUS pr. kg mel, øger porehomogeniteten af krummen på brød fremstillet fra denne dej med mindst 5%, i forhold til brød som er fremstillet fra brøddej, der ikke er tilsat lipasen.

30. Et polypeptid ifølge et hvilket som helst af de foregående krav for hvilket det gælder at det, når det sættes til brøddej i en mængde på 5.000 LUS pr. kg mel, øger dejens glutenindeks med mindst 5%, i forhold til dej der ikke er tilsat polypeptidet: glutenindekset bestemmes ved hjælp af et Glutomatic 2200 apparat.

5

31. Et rekombinant DNA-molekyle omfattende en nucleotid-sekvens kodende for polypeptidet ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30.

32. Et rekombinant DNA-molekyle ifølge krav 31 omfattende mindst én af SEQ ID

10 NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6 og SEQ ID NO:7.

33. Et rekombinant DNA-molekyle ifølge krav 31 omfattende SEQ ID NO:8 eller en variant, homolog eller fragment deraf eller en sekvens som er komplementær dertil.

15 34. Et rekombinant DNA-molekyle ifølge krav 31 som koder for et polypeptid som defineret i et hvilket som helst af kravene 1-30, som ikke omfatter aminosyre(r) som tilvejebringer glycosylerings-site(s).

35. Et rekombinant DNA-molekyle ifølge krav 31, som er et plasmid udvalgt fra

20 gruppen bestående af et plasmid deponeret under accessionsnumrene NCIMB 40863, NCIMB 40931, NCIMB 40932, NCIMB 40933, NCIMB 40934 og NCIMB 40935.

36. En celle omfattende et rekombinant DNA-molekyle ifølge et hvilket som helst af

kravene 31-35 og som er i stand til at udtrykke polypeptidet ifølge et hvilket som helst

25 af kravene 1-30.

37. En celle ifølge krav 36 som er en mikroorganisme udvalgt fra gruppen bestående af en svamp, gær, bakterie, plantecelle og dyrecelle.

30 38. En celle ifølge krav 37 som er en filamentøs svamp udvalgt fra gruppen bestående af en *Aspergillus* sp., en *Penicillium* sp., en *Rhizomucor* sp., en *Mucor* Sp., en *Trichoderma* sp., en *Neurospora* sp. og en *Humicola* sp.

39. En celle ifølge krav 38 som er *Aspergillus tubigensis*.

35

40. En fremgangsmåde til fremstilling af et polypeptid ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30 omfattende transformation af en værtscelle med et rekombinant DNA-molekyle ifølge et hvilket som helst af kravene 31-39, værtsellen er i stand til at udtrykke nucleotidsekvensen kodende for polypeptidet, dyrkning af den transformerede værtscelle under betingelser, hvor nucleotidsekvensen udtrykkes og opsamling af polypeptidet.
41. En fremgangsmåde ifølge krav 40 som omfatter yderligere trin til isolering af polypeptidet på i det væsentlige ren form.
- 10 42. En fremgangsmåde til fremstilling af et bagt produkt med forbedret porehomogenitet og reduceret porediameter, fremgangsmåden omfatter tilsætning af polypeptidet ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30 eller polypeptidet fremstillet ifølge krav 40 eller 41 til dejen.
- 15 43. En fremgangsmåde ifølge krav 42, hvor dejen ikke indeholder tilsatte lipider.
44. En fremgangsmåde ifølge krav 42 eller 43, omfattende tilsætning af polypeptidet til dejen, i en mængde som resulterer i mindst 10% reduktion af den gennemsnitlige porediameter i krummen på brød fremstillet fra dejen, i forhold til et brød som er fremstillet fra en brøddej uden tilsætning af polypeptidet.
- 20 45. En fremgangsmåde ifølge krav 42 eller 43, omfattende tilsætning af polypeptidet til dejen, i en mængde som resulterer i mindst 5% stigning i porehomogeniteten i krummen på brød fremstillet fra dejen, i forhold til et brød som er fremstillet fra en brøddej uden tilsætning af polypeptidet.
- 25 46. En fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 42-45, omfattende tilsætning af polypeptidet til dejen, i en mængde som resulterer i mindst 5% stigning i dejens glutenindeks i forhold til en dej der ikke tilsættes polypeptidet; glutenindekset er bestemt ved hjælp af et Glutomatic 2200 apparat.
- 30 47. En fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 42-45, hvor polypeptidet sættes til dejen i en mængde som ligger mellem 100-30.000 lipase units (LUS) pr. kg mel inkluderende en mængde som ligger mellem 500-10.000 lipase units (LUS) pr. kg. mel.

48. En fremgangsmåde ifølge krav 47, hvori en emulgator sættes til dejen.
49. En fremgangsmåde ifølge krav 48, hvori emulgatoren er diacetylvinylester af
5 mono- og diglycerider af spiselige fedtsyrer.
50. En fremgangsmåde ifølge krav 49, hvori diacetylvinylesteren har en
forsæbningsværdi som ligger mellem 300 og 600 og en syreværdi som ligger mellem
40 og 120.
- 10 51. En fremgangsmåde ifølge krav 50, hvori diacetylvinylesteren tilsættes i en
mængde som ligger mellem 0,1-1,0 vægt-% af melet.
- 15 52. En fremgangsmåde ifølge krav 42 hvori mindst et yderligere enzym sættes til
dejen.
53. En fremgangsmåde ifølge krav 52 hvori det yderligere enzym er udvalgt fra
gruppen bestående af en hemicellulase, en protease, en amylase, en oxidoreduktase
og en cellulase.
- 20 54. Anvendelse af et polypeptid ifølge et hvilket som helst af kravene 1-30 eller et
polypeptid fremstillet ved en proces ifølge krav 40, i en dej til et bagt produkt for at
forbedre stabiliteten af glutennettværket i dejen og/eller for at bibringe forbedret
porehomogenitet og/eller for at reducere porediameteren i det bagte produkt og/eller
25 for at gøre bagte produkter mindre tilbøjelige til at deformeres mekanisk.
55. Anvendelse ifølge krav 54 hvori glutenindekset i dejen er øget med mindst 5% i
forhold til en dej som er fremstillet uden tilsætning af polypeptidet; glutenindekset
bestemmes ved hjælp af et Glutomatic 2200 apparat.
- 30 56. En dejforbedrende sammensætning omfattende polypeptidet ifølge et hvilket som
helst af kravene 1-30 og mindst én yderligere konventionel dej-additiv-bestanddel.
- 35 57. En sammensætning ifølge krav 56 hvori den yderligere forbindelse er valgt fra
gruppen bestående af et enzym og en emulgator.

58. Et rekombinant DNA-molekyle omfattende en nucleotid-sekvens kodende for et polypeptid udvisende lipaseaktivitet som omfatter mindst én af aminosyresekvenserne vist heri som SEQ ID NO:1, SEQ ID NO:2 og SEQ ID NO:3 eller en nucleotid-sekvens kodende for et polypeptid udvisende lipaseaktivitet som omfatter aminosyresekvensen vist som SEQ ID NO: 9.
59. Et rekombinant DNA-molekyle omfattende mindst ét af SEQ ID NO:4, SEQ ID NO:5, SEQ ID NO:6 og SEQ ID NO:7 eller i det mindste den kodende sekvens af nucleotid-sekvensen vist som SEQ ID NO:8 eller en variant, homolog eller fragment
10 deraf eller en sekvens der er komplementær dertil.